

Octicide 1 mg/20 mg/g nahasprei, lahus

oktenidiindivesinikloriid/fenoksüetanool



Kui te kasutate Octicide't rohkem, kui ette nähtud
Üleannustamise kohta andmed puuduvad. Octicide kasutamisel vastavalt juhistele on üleannustamine äärmiselt ebatõenäoline. Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 14 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Octicide ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Octicide kasutamist
3. Kuidas Octicide't kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Octicide't säilitada
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Octicide ja milleks seda kasutatakse

Octicide on antiseptiline lahus (desinfektant) paikseks kasutamiseks. Seda kasutatakse lühiajaliselt bakterite ja seente hävitamiseks limaskestadele ja nendega piirnevale nahale manustamisega enne kirurgilisi protseduure väliste sugu- ja erituselundite piirkonnas ning uriinikateetri paigaldamist. Samuti haavade korduvaks lühiajaliselt antiseptiliseks raviks. Octicide't tohib kasutada kuni 14 päeva.

Kasutamine ilma arsti ettekirjutuseta

Ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata võib Octicide't kasutada pindmise haavade (marrastused, kriimustused, väikesed sisselõiked, põletused ja putukahammustused) antiseptiliseks raviks täiskasvanutel, noorukitel ja lastel.

Kasutamine arsti ettekirjutuse alusel

Lühiajaliselt korduvaks põletuste ja suuremate haavade antiseptiliseks raviks, vaginaalseks ja emakakaela antiseptiliseks raviks, peenise pea desinfitseerimiseks.

Meditsiiniline kasutus

Limaskestade ja nendega piirneva naha antiseptiliseks raviks enne diagnostilisi või kirurgilisi protseduure väliste sugu- ja erituselundite ümbruses ja uriinikateetri paigaldamist ning samuti haavade korduvaks lühiajaliselt antiseptiliseks raviks.

2. Mida on vaja teada enne Octicide kasutamist

Octicide't ei tohi kasutada

- kui olete oktenidiindivesinikloriidi, fenoksüetanooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
- Ravimit ei tohi kasutada silmas.

Arstidele

Octicide't ei tohi kasutada operatsiooni ajal kõhuõõne või põie loputamiseks. Seda ei tohi manustada ka kuulmekilele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

- Enne Octicide kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Vältige Octicide sattumist vereringesse, nt spreid tahtmatu süstimisega. Ärge hingake pihustamise ajal sisse.
- Kudede kahjustuse vältimiseks ei tohi seda ravimit manustada surve all. Tuleb tagada lahuse drenaaž haavade õõnsustest (nt sobiva painduva dreni abil). Octicide on ettenähtud ainult pinnale kandmiseks.
- Octicide sattumist silma tuleb vältida. Juhuslikul silma sattumisel tuleb silmi kohe loputada rohke veega.
- Octicide't tohib kasutada oklusivsel sidumisel.
- Kokkupuude teiste pesu- ja puhastusvahenditega võib muuta Octicide ebaefektiivseks.

Lapsed ja noorukid

Octicide't võib kasutada lastel ja noorukitel. Octicide tuleb vastsündinutel, eriti enneaegsetel imikutel kasutada ettevaatusega. Octicide võib põhjustada tõsiseid

nahakahjustusi. Eemaldage liigne lahus ja veenduge, et lahus ei jääks nahale kauemaks kui vaja (kaasa arvatud materjalid, millel on lahuse tilgad, mis on otseses kokkupuutes patsiendi nahaga).

Muud ravimid ja Octicide

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, sealhulgas käsimüügiravimeid.

Ärge kasutage Octicide't nahapiirkonna lähedal, mida on töödeldud povidoon-joodil põhinevate antiseptikumidega (desinfektandid), sest nahk võib kokkupuutekohal värvuda tumepruuniks või lillaks.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, rääkige enne selle ravimi kasutamist oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Senised kogemused Octicide kasutamisega rasedatel ei viita kahjulikule toimele.

Ettevaatusabinõuna ärge kasutage Octicide't esimese kolme raseduskuu jooksul. Alates neljandast raseduskuust võib Octicide't kasutada vajadusel.

Imetamine

Puuduvad andmed Octicide kasutamise kohta imetamise ajal. Octicide't ei tohi kasutada imetavatel emadel rinnapiirkonnas.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Octicide ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitlemise võimet.

3. Kuidas Octicide't kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt vastavalt sellele pakendi infolehele või nagu arst või apteeker on teid juhendanud. Kui te ei ole milleski kindel, küsige oma arsti või apteekri käest.

Octicide't kasutatakse lahjendamata. Parema tulemus saavutatakse manustamisel kohe pärast vigastust või esmaste põletikunähtude ilmnemisel.

Kui arst ei ole määranud teisiti, manustage Octicide't haavade ja vigastuste raviks kahjustatud piirkonnale 1 kord ööpäevas, mitte kauem kui 14 päeva.

Manustage Octicide't ohtralt mehhaanilise pihusti korduva vajutamise, nii et kogu ravitav piirkond on niisutatud.

Väikeste vigastuste korral ei ole täiendav katmine, side-me või plaastri paigaldamine tavaliselt vajalik. Siiski, et vältida haava hilisemat saastumist, on soovitatav haav katta sidemega.

Pidage meeles, et toote täielik toime tekib alles 1...2 minutit pärast manustamist, nii et oodake nii kaua enne edasiste protseduuridega jätkamist. Octicide maksimaalne toime on tagatud kuni 2 tunni jooksul pärast manustamist.

Kui haav ei parane korralikult, sellel esineb põletikusümptomeid (punetus, põletustunne, paistetused manustamiskohas) või kui te täheldate ravi ajal muid tüsistusi, teatage sellest oma arstile või apteekrile.

Ärge kasutage seda ravimiparaati ilma arstiga nõu pidamata kauem kui 14 päeva.

Octicide korduva manustamise kogemused piirnevad 14 päevaga, seega ei tohi seda ravimit kasutada sellest pikema aja jooksul.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Oktenidiindivesinikloriidi ja fenoksüetanooli sisaldava ravimi kasutamisel on täheldatud järgmiste kõrvaltoimete teket:

Harv (võib esineda kuni 1-l inimesel 1000-st): põletus, punetus, sügelus või kuumatunne manustamiskohas.

Väga harv (võib esineda kuni 1-l inimesel 10000-st): kontaktallergilised reaktsioonid.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Octicide't säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Pärast esmast avamist tuleb Octicide ära kasutada 12 kuu jooksul, kuid mitte pärast kõlblikkusaaja lõppemist.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Octicide sisaldab

Toimeained on oktenidiindivesinikloriid ja fenoksüetanool. 1 g lahust sisaldab 1 mg oktenidiindivesinikloriidi ja 20 mg fenoksüetanooli.

Teised koostisosad on kokamidopropüülbetaaniin 38% lahus (sisaldab kokamidopropüülbetaaniini, kookospähkli rasvhappeid, glütseriini, vett, naatriumkloriidi), naatriumglükonaat, 85% glütserool, 10% naatriumhüdrosiid lahus (pH reguleerimiseks), puhastatud vesi.

Kuidas Octicide välja näeb ja pakendi sisu

Octicide on selge, kergelt läbipaistev, peaaegu värvitu lahus, mis on saadaval 50 ml (50 g) või 250 ml (250 g) nahalahust sisaldavates valgetes polüetüleenist (HDPE) pudelites (HDPE), millel on valge polüoksümetüleenist (POM), polüetüleenist (LDPE) ja polüpropüleenist (PP) mehhaaniline roostevabast terasest vedruga pihustus-pump ning mis on pakendatud pappkarpi.

Pakendi suurus on 50 ml ja 250 ml.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

ENEO Pharmaceuticals s. r. o.
Pražská 442
281 67 Střibná Skalice
Tšehhi

Tootja

PROFARMA-PRODUKT, s. r. o.
Liberecká 801/20
466 01 Jablonec nad Nisou
Tšehhi

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2024.